



Cauzele autismului nu sunt pe deplin înțelese, însă dovezile NU trimit către vaccinuri.

Adesea, părinții observă primele comportamente din spectrul autist atunci când copilul are 18-24 luni - vârstă la care majoritatea copiilor au fost deja vaccinați. Din acest motiv, mulți părinți **asociază în mod incorect** vaccinările cu debutul autismului.

Însă specialiștii în dezvoltarea copilului pot identifica semnele inițiale ale autismului la copii cu vârste mult mai mici.

Aceste cercetări sprijină consensul științific că, în majoritatea cazurilor, precursorii autismului sunt prezenți înainte de nașterea copilului.



Preocupări sau îngrijorări legate de vaccinul ROR

Număr de telefon.....

(WhatsApp)

Adresă de e-mail.....



CENTRUL NAȚIONAL
PENTRU POLITICI
ȘI SERVICII DE SĂNĂTATE





Dacă vaccinul ROR nu cauzează autism, de ce se stabilește diagnosticul cam în aceeași perioadă cu vaccinarea?

Unul dintre criteriile utilizate în diagnosticarea autismului este întârzierea în dezvoltarea limbajului. Deoarece copiii nu dezvoltă un limbaj expresiv semnificativ sub vârsta de un an, medicii trebuie să aștepte până la vârsta de 15-18 luni pentru a confirma o întârzierea în dezvoltarea limbajului și a stabili diagnosticul.

Cam acesta este perioada administrării vaccinului ROR, lucru care îi determină pe unii părinți să facă această corelație între autism și vaccinare.




Aspecte importante de avut în vedere atunci când luați decizia referitoare la parcursul de vaccinare al copiilor dvs.:

1. În deciziile privind sănătatea copilului dvs., nu vă bazați pe dezinformări și zvonuri! Discutați cu medicul copilului dvs. despre orice îngrijorări legate de siguranța vaccinului!

2. Autismul este o temă dificilă, cu profunde implicații emoționale, de care tuturor ne pasă. Însă corelația cu autismul făcută de un singur medic a **fost ferm discreditată**. Acum avem nenumărate studii care demonstrează că nu există nicio legătură între vaccinul ROR și autism.

3. Odată sădită sămânța îndoielii, aceasta este ușor alimentată de mass-media de scandal și de relatările de pe internet care fac apel la emoții.




4. Încercați să vă concentrați asupra faptelor, subiectul real este necesitatea de a proteja copiii împotriva unor boli care pot fi prevenite (rujeola, de exemplu).

5. Pentru a fi protejați, copiii trebuie să li se administreze de două ori vaccinul ROR, care îi protejează și de oreion și rubeolă.

Evoluția vaccinării ROR și a autismului în Canada

Acoperirea vaccinală ROR și PDD*



Graficul arată că într-o perioadă de 10 ani vaccinarea contra rujeolei (linia albastră) a fost stabilă, cu o ușoară scădere, pe când prevalența tulburărilor pervazive de dezvoltare – PDD (linia verde), un termen utilizat pentru tulburările de spectru autist, a crescut.

* ImmunizeBC. Instrument de comunicare privind imunizarea: www.immunizebc.ca